ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ РЕБЕНКА

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ:

- 1. Объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо дома;
- 2. Если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо остановиться и пропустить этого человека вперед;
- 3. Стать родителю для ребенка другом, с которым он может поделиться своими переживаниями;
- 4. Серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны знакомых, родственников;
- 5. Поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями;
- 6. Не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность совершения преступления снижается);
- 7. Знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов с сексуальными сценами и сценами насилия, исключить возможность общения Вашего ребенка с педофилом через Интернет;
- 8. Обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, быть в курсе, с кем Ваш ребенок контактирует в сети.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ИЛИ ПОДРОСТОК ПОДВЕРГСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ?

- 1. Вялость, апатия, пренебрежение к своему внешнему виду;
- 2. Постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти, общее снижение настроения;
- 3. Уход от контактов, изоляция от друзей и близких или поиск контакта с целью найти сочувствие и понимание;
- 4. Нарушение умственных процессов (мышления, восприятия, памяти, внимания), снижение качества выполняемой учебной работы;
- 5. Отсутствие целей и планов на будущее;
- 6. Чувство мотивированной или немотивированной тревожности, страха, отчаяния;
- 7. Пессимистическая оценка своих достижений;
- 8. Неуверенность в себе, снижение самооценки.
- 9. Проблемы со сном, кошмары, страх перед засыпанием.
- 10. Головные боли, боли в желудке, соматические симптомы.
- 11. Повышенная агрессивность и (или) высокая активность (гиперактивность).
- 12. Постоянная тревога по поводу возможной опасности или беспокойство по поводу безопасности любимых людей.
- 13. Признаки, связанные со здоровьем.
- 14. Нежелание общения и неучастие в играх и любимых занятиях.



ЖЕРТВАМИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУ-

плений чаще оказываются дети и

подростки, запущенные с точки зрения

полового воспитания. Пусть дети не

позволяют, чтобы незнакомцы, знако-

мые или даже дальние родственники тро-

постарайтесь, чтобы дети

РАССКАЗЫВАЛИ ВАМ ОБО

всем, что происходит с

НИМИ. Объясните, что насильники или

вежливо уговаривают, или запугивают

детей, добиваясь, чтобы они сохранили

гали их, целовали, обнимали.

это втайне.

НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО ПРЕСТУП-

ники могут применить не

только насильственные, но и «СО-

БЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ» приемы. Они

могут пригласить их к себе, обещая пока-

зать что-то интересное. Соблазнитель

зовет вместе погулять либо напрашива-

SHANTE 4TO DETH OXOTHEE

ИДУТ НА КОНТАКТ (ОСОБЕННО

С 6 ДО 12 ЛЕТ), что прибавляет

насильнику уверенности, он стремится

расположить к себе ребенка, одновре-

менно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и приятную забаву.

ется в провожатые.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ -

вовлечение зависимых, незрелых в развитии детей и подростков в сексуальную деятельность, которую они не понимают и на которую они не в состоянии дать осознанное согласие, или которая нарушает социальные табу семейных ролей. По отношению к ребенку это любая активность сексуального плана, которая превышает нормы общения с ним.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ -

это удовлетворение половой страсти с ребенком против его желания в условиях, когда ребенок не в состоянии отказаться от этого и защитить себя вследствие неравенства физических сил.

В случае сексуального насилия можно обнаружить как физические признаки, так и изменения в поведении ребенка

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

- порванное, запачканное или окровавленное нижнее белье;
- гематомы в области половых органов;
- гематомы на груди, ягодицах, нижней части живота, бедрах;
- боль в животе, головная боль;
- повторяющееся воспаление мочеиспускательных путей;
 - венерическая болезнь;
 - беременность.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА

Изменения в выражении сексуальности ребенка:

- чрезмерный интерес к играм сексуального содержания;
- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
- соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу;

 необычная сексуальная активность: частое раздражение половых органов.

изменения в эмоциональном состоянии ребенка

- замкнутость;
- депрессивность, грустное настроение;
 - частая задумчивость;
- истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;
- трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними.

Изменения самосознания ребенка:

- снижение самооценки;
- мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

Появление страхов:

- бонтся остаться в помещении наедине с определенным человеком;
- бонтся раздеваться, поэтому, например, может категорически отказаться от участия в занятиях по гимнастике;
- панически бонтся снимать труснки во время медицинского осмотра.